



Vaccinationsreaktioner

På pinscher och dvärgpinscher

- viktig information!

Hos rasen pinscher, och till viss del även hos dvärgpinscher, förekommer reaktioner på vaccin. Dessa reaktioner kan yttra sig på olika sätt och i olika intensitet.

Då dessa vaccinationsreaktioner inte är så kända, varken bland veterinärer eller valpköpare, vill vi på detta sätt sprida kunskap om symptom och behandling.

Det är av stor vikt att dessa reaktioner tas på allvar och behandlas på rätt sätt.

Symtom

Vanligtvis i samband med första vaccineringen efter att valpen flyttat hem till sin ägare, vid 12 veckors ålder, kan något som kallas ”vaccinationskomplikation” uppstå. Vaccinationskomplikationer kan även visa sig vid senare, eller tidigare, vaccinationstillfällen. Detta är en överkänslig reaktion av vaccinet.

De typiska reaktionerna visar sig ca 7-10 dagar efter vaccineringen, även om stora variationer förekommer. Reaktionerna varierar mellan allt ifrån en bula i nacken efter sticket till ostadighet, darrningar, kramper, inkontinens och i värsta fall medvetslöshet.

Behandling

Den viktigaste, och som det visat sig vara den mest effektiva behandlingen, är kortison. Hundar som genast satts på kortison har i allmänhet blivit symptomfria efter 1½ dygn. Även kramplösande medicin, vanligtvis Stesolid, kan vara nödvändig. Kramplösande medicin får aldrig sättas in i stället för kortison utan ska i så fall användas i kombination med kortison. Valpen får inte, under några omständigheter, sovas.

Kortison måste ges för att den allergiska reaktionen ska avta och den kramplösande medicin kan vara nödvändigt för att få stopp på eventuella kramper. En del hundar har även som tillägg behandlats med B-vitamin, antibiotika och mediciner mot illamående.

Viktigt!

Det är många valpar som avlivats och dött i onödan pga att denna information inte nått ut till veterinärer och kliniker. I länksamlingen till höger finns ovärderlig information som kan rädda valpar som drabbas.

Hundägare, läs detta:

- Ställ krav på att din veterinär läser detta dokument och informationen som finns länkad nedan.
- Om olyckan är framme och du känner dig osäker på att du får den hjälp du behöver av veterinären, prata med din uppfödare och be dem om hjälp i kontakten med behandlande veterinär.
- Notera datumet då du låter vaccinera din valp, det kan vara bra att ha lättillgängligt.
- Tillåt inte, under några omständigheter, att veterinären sover din valp!

Veterinär, läs detta:

- Läs igenom detta dokument och de dokument som finns länkade nedan.
- Om en valp kommer in med symptom som kan vara en allergisk reaktion på vaccin, sov inte valpen under några som helst omständigheter!
- Då det kan vara bråttom, kontakta valpens uppfödare för mer information om dessa symptom.
- Rapportera misstänkt fall av vaccinationsreaktion till: ak@pinschersektionen.se

Länksamling

Här finns länkar till information som kan vara livsavgörande för en valp med reaktion på vaccin. Kopiera länken och klistra in i din webbläsare.

Artikel i Svensk veterinärtidning nr 6/2006

<http://www.pinschersektionen.se/wp-content/uploads/2013/04/Svensk-veterinartidning-nr-6-2006.pdf>

Artikel i Finsk veterinärtidning Tabu nr:1 2005

<http://www.pinschersektionen.se/wp-content/uploads/2013/04/Artikel-i-Finsk-veterinartidning-Tabu-nr-1-2005.pdf>

Vaksiner og vaksinasjons-komplikasjoner hos hund

<http://www.pinschersektionen.se/wp-content/uploads/2013/04/Vaksiner-og-vaksinasjons-komplikasjoner-hos-hund.doc>

Post-vaccinal reactions in German Pinschers – preliminary report

<http://www.pinschersektionen.se/wp-content/uploads/2013/04/Post-vaccinal-reactions-in-German-Pinschers—preliminary-report.doc>

Hjälp gärna till att sprida denna information. Tack på förhand!